

Impfkalender

Für Kinder ab 9 Jahren, Jugendliche und Erwachsene

Gemäß Impfkalender der STIKO^{1,2} z.B. mit Impfstoffen von GlaxoSmithKline*

Impfungen	Alter in Jahren ^{2,3}		
	9-16	17	Ab 18
Boostrix Tetanus Diphtherie Pertussis Boostrix Polio Tdap-IPV	Auffrischimpfung 1 Impfung mit Tdap-IPV	N	Auffrischimpfung⁶ alle Erwachsenen sollen die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdpa-Kombinationsimpfung erhalten ⁷ Indikationsimpfung Pertussis^{7,8} Frauen im gebärfähigen Alter sowie enge Haushaltskontaktpersonen eines Neugeborenen 1 Impfung
Priorix Masern Mumps Röteln	Nachholimpfung^{5,13} 2 Impfungen: 0-1 Monat		Standardimpfung Masern nach 1970 geborene Personen, die älter als 18 Jahre sind 1 Masern-Mumps-Röteln-Impfung ⁹ Indikationsimpfung Röteln Frauen im gebärfähigen Alter 2 Impfungen ¹⁰ : 0-1 Monat bei entsprechender Indikation als Masern-Mumps-Röteln-Impfung
Varilrix Varizellen	Nachholimpfung⁴ 2 Impfungen: 0-6 Wochen		Indikationsimpfung seronegative Frauen mit Kinderwunsch 2 Impfungen: 0-6 Wochen
Engerix-B Kinder/Erwachsene¹⁴ Hepatitis B	Nachholimpfung⁵ 3 Impfungen: 0-1-6 Monate		
Cervarix** Gebärmutterhalskrebs und andere durch HPV verursachte Tumore	Standardimpfung Mädchen und Jungen 9-14 Jahre 2 Impfungen: 0 und 5 bis 13 Monate Nachholimpfung Mädchen und Jungen 15 Jahre und älter ^{11,12} 3 Impfungen: 0-1-6 Monate		
Influsplit Tetra saisonale Grippe (jährlich)	Indikationsimpfung alle chronisch Kranken, neu seit 2010 : alle Schwangeren ab 2. Trimenon ¹⁵		Standardimpfung
Pneumokokken	Indikationsimpfung alle chronisch Kranken mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung ¹		Standardimpfung
Menjugate Meningokokken C	Nachholimpfung⁵		

1. Gemäß Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO), Stand August 2018, Quelle: Epidemiologisches Bulletin 34/2018
 2. Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden
 3. Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensjahres
 4. Ungeimpfte ohne durchgemachte Windpocken Erkrankung
 5. Für bisher nicht geimpfte Kinder und Jugendliche
 6. Jeweils 10 Jahre nach der letzten vorangegangenen Dosis
 7. Bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV
 8. Sofern in den letzten 10 Jahren keine Pertussis-Impfung stattgefunden hat

9. Bei unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
 10. Ungeimpfte oder Frauen mit unklarem Impfstatus bzw. einmalig bei einmaliger Vorimpfung
 11. Frauen, die innerhalb des von der STIKO empfohlenen Zeitraumes keine Impfung gegen HPV erhalten haben, können ebenfalls von einer Impfung gegen HPV profitieren
 12. Spätestens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (d. h. bis zum Tag vor dem 18. Geburtstag) sollen versäumte Impfungen gegen HPV nachgeholt werden

13. Für Kinder bis zum 13. Geburtstag bei Indikation als Priorix Tetra mit Varizellenkomponente
 14. Altersgrenze zwischen Kindern u. Erwachsenen 16. Geburtstag
 15. Bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon
 * Für Impfstoffe von anderen Herstellern beachten Sie ggf. abweichende Impfschemata
 ** 3 Impfungen ab 15 Jahre (siehe Fachinformation)

IMPFFEN SCHÜTZT



Boostrix/Boostrix Polio

Wirkstoff: Diphtherie-Tetanus-Perussis (azellulär)-Kombinationsimpfstoff bzw. Diphtherie-Tetanus-Perussis (azellulär)-inaktiver Polio-myelitis-Kombinationsimpfstoff (adsorbiert) zur Auffrischungsimpfung. **Zusammensetzung:** 1 Impfdosis Boostrix (0,5 ml Suspension) enthält: ≥ 2 I.E. (2,5 I.U.) Diphtherietoxoid, ≥ 2 I.E. (5 I.U.) Tetanustoxoid, 8 µg Pertussistoxoid (PT), 8 µg filamentöses Haemagglutinin (FHA), 2,5 µg Pertactin (69 kD, PRN), adsorbiert an Aluminiumhydroxid gesamt 0,3 mg Al³⁺ und Aluminiumphosphat gesamt 0,2 mg Al³⁺; Boostrix Polio enthält weiter inaktivierte, in Affenriemen-Zellkulturen (VERO-Zelllinie) vermehrte Polio-myelitis-Viren 40 D-Antigen-einheiten Typ 1 (Mahoney), 8 D-Antigen-einheiten Typ 2 (MEF1), 32 D-Antigen-einheiten Typ 3 (Saukett). **Sonstige Bestandteile:** Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Weitere sonstige Bestandteile in Boostrix Polio: Medium 199 (als Stabilisator, bestehend aus Aminosäuren, Mineralen, Vitaminen u. a. Stoffen), Neomycin oder Polymyxin. **Anwendungsgebiete:** Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis ab dem vollendeten 4. Lebensjahr bzw. Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis bei Personen ab dem vollendeten 3. Lebensjahr. **Gegenanzeigen:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Impfstoffes (enthält Spuren von Neomycin und Polymyxin), Zeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion nach früherer Verabreichung von Diphtherie-, Tetanus-, Pertussis- oder Poliomyelitis-Impfstoffen, Enzephalopathie unbekannter Genese innerhalb einer Woche nach früherer Impfung mit einem Pertussisimpfstoff, Passagere Thrombozytopenie oder neurologische Komplikationen (Krampfanfälle, Hypotone hyporesponsive Episode) nach früherer Diphtherie- und/oder Tetanusimpfung. Zurückstellung bei akuten und mit hohem Fieber einhergehenden Erkrankungen. Folgende **Nebenwirkungen** wurden in einem möglichen Zusammenhang mit einer Impfung mit Boostrix/Boostrix Polio-Impfung gebracht. Im Alter von 4-8 Jahren: **Sehr häufig:** Schmerzen, Rötung und Schwellungen an der Injektionsstelle. **Häufig:** Fieber $\geq 37,5$ °C einschließlich > 39 °C, Reaktion an der Injektionsstelle wie Blüte, Juckreiz, Verhärtung oder ödematöse Schwellung, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen. **Gelegentlich:** Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Lymphadenopathie, Schläfrigkeit, Teilmastosität, trockener Rachen, Müdigkeit. Ab einem Alter von 10 Jahren: **Sehr häufig:** Schmerzen, Rötung und Schwellungen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen. **Häufig:** Fieber $\geq 37,5$ °C, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Reaktion an der Injektionsstelle wie Blutungss, Juckreiz, Verhärtung, Wärmegefühl oder Taubheit. **Gelegentlich:** Fieber $\geq 39,0$ °C, Schwellung der Extremität, Schüttelfrost, Schmerzen, Schwindel, Gelenk- und Muskelschmerz, Lippenerhes, Lymphadenopathie, Appetitlosigkeit, Parästhesie, Schläfrigkeit, Asthma. Folgende Nebenwirkungen traten nach Markteinführung altersunabhängig auf: Hypotone-hyporesponsive Episoden, Krampfanfälle. Folgende weitere Nebenwirkungen traten im Zusammenhang mit einer Impfung mit Boostrix/Boostrix Polio auf. Im Alter von 4 bis 8 Jahren: **Gelegentlich:** Infektionen der oberen Atemwege, Aufmerksamkeitsstörung, Konjunktivitis, Hautausschlag, Schmerzen. Ab einem Alter von 10 Jahren: **Sehr häufig:** Unwohlsein. **Häufig:** Verhärtung an der Injektionsstelle. **Gelegentlich:** Infektion der oberen Atemwege, Pharyngitis, Synkope, Husten, Durchfall, Hyperhidrose, Hautausschlag, Gelenksteife und Muskelsteifheit, grippeähnliche Beschwerden. Folgende Nebenwirkungen traten nach der Markteinführung von Boostrix/Boostrix Polio altersunabhängig auf: Angiodödem, Urtikaria, Asthenie. Sehr selten ist nach Verabreichung von Tetanustoxoid-haltigen Impfstoffen über Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, einschließlich aufsteigender Lähmungen bis zur Atemlähmung (z. B. Guillain-Barré-Syndrom) berichtet worden. Wie bei allen Impfstoffen können sehr selten allergische oder anaphylaktische Reaktionen auftreten.

Verschreibungspflichtig. Stand: Februar 2017. **GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. www.glaxosmithkline.de**

Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Eine Impfdosis von 0,5 ml tief i.m. **Weitere Warnhinweise laut Fachinformation:** Boostrix/Boostrix Polio sind bei Patienten mit Thrombozytopenie oder einer Blutgerinnungsstörung mit Vorsicht zu verabreichen. Boostrix/Boostrix Polio dürfen unter keinen Umständen intravasal gegeben werden. Bei Jugendlichen kann es als psychogene Reaktion auf die Nadelinjektion nach oder sogar vor einer Impfung zu einer Synkope (Ohnmacht) kommen. **Weitere Informationen siehe Fachinformation.**

Nebenwirkungsmeldungen richten Sie bitte ggf. an die GSK-Hotline: 0800-1223355

Cervarix

Wirkstoff: Humaner Papillomavirus-Impfstoff [Typen 16, 18] (rekombinant, adjuvantiert, adsorbiert). **Zusammensetzung:** 1 Dosis (0,5 ml) enthält: L1-Protein vom humanen Papillomavirus-Typ 16: 20 Mikrogramm; L1-Protein vom humanen Papillomavirus-Typ 18: 20

Mikrogramm. Humanes Papillom-virus = HPV. Adjuvantiert mit AS04, das enthält: 3-O-deacetyl-4-monophosphoryl-lipid A (MPL): 50 Mikrogramm. Adsorbiert an wasserhaltiges Aluminiumhydroxid (Al(OH)₃). Gesamt: 0,5 mg Al³⁺-L1-Protein in Form von nicht-infektösen, virusähnlichen Partikeln (VLPs), hergestellt mittels rekombinanter DNA-Technologie unter Verwendung eines Baculovirus-Expressionssystems, für das Hi-5 Rix4446-Zellen, die aus *Trichoplusia ni* gewonnen werden, verwendet werden. **Sonstige Bestandteile:** Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat und Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Cervarix ist ein Impfstoff zur Anwendung ab einem Alter von 9 Jahren zur Prävention von prämaligen ano-genitalen Läsionen der Zervix, Vagina, Vagina und des Anus sowie von Zervix- und Analkarzinomen, die durch bestimmte onkogene humane Papillomviren (HPV) verursacht werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Die Verabreichung von Cervarix sollte im Falle einer akuten, schweren, mit Fieber einhergehenden Erkrankung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Leichte Infekte, wie eine Erkältung, stellen im Allgemeinen jedoch keine Kontraindikation für die Impfung dar. **Nebenwirkungen: Sehr häufig:** Schmerzen, Unbehagen, Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit. **Häufig:** Magen-Darmbeschwerden, einschließlich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen, Juckreiz, Hautausschlag, Nesselsucht, Gelenkschmerzen, Fieber (≥ 38 °C). **Gelegentlich:** Infektionen der oberen Atemwege, Schwindel, Verhärtung, Brennen oder Taubheitsgefühl. Im Rahmen der Beobachtung im praktischen Einsatz wurde über folgende Nebenwirkungen berichtet: Ohnmachtsanfälle (manchmal begleitet von Krampfanfällen) und allergische Reaktionen (einschließlich allergischer Schock und ein Anschwellen der Haut im Kopfbereich durch Wassereingliederung), Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems. **Warnhinweise:** Wie bei allen injizierbaren Impfstoffen sollten für den seltenen Fall einer anaphylaktischen Reaktion nach der Gabe des Impfstoffes stets entsprechende medizinische Behandlungs- und Überwachungsmöglichkeiten sofort verfügbar sein. **Verschreibungspflichtig. Stand: Februar 2017. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. www.glaxosmithkline.de.**

Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Das Impfschema richtet sich nach dem Alter der zu impfenden Person:

Alter zum Zeitpunkt der ersten Dosis	Impfschema
9 bis 14 Jahre*	2 Dosen (je 0,5 ml). Die zweite Dosis kann im Abstand von 5 bis 13 Monaten nach der ersten Dosis verabreicht werden.
15 Jahre und älter**	3 Dosen (je 0,5 ml) im Monat 0, 1 und 6

*Wenn die zweite Impfdosis frühestens ab 5 Monate nach der ersten Dosis verabreicht wird, sollte immer eine dritte Dosis gegeben werden. **Wenn ein flexibles Impfschema notwendig ist, kann die zweite Dosis im Abstand von 1 bis 25 Monaten nach der ersten Dosis und die dritte Dosis im Abstand von 5 bis 12 Monaten nach der ersten Dosis verabreicht werden. **Weitere Warnhinweise laut Fachinformation:** Besonders bei Jugendlichen kann es als psychogene Reaktion auf die Nadelinjektion nach oder sogar vor einer Impfung zu einer Synkope (Ohnmacht) kommen. Diese kann während der Erholungsphase von verschiedenen neurologischen Symptomen wie vorübergehender Schörmung, Parästhesie und tonisch-klonische Bewegungen der Gliedmaßen begleitet sein. Cervarix darf auf keinen Fall intravasal oder intradermal verabreicht werden. Zur subkutanen Verabreichung von Cervarix liegen keine Daten vor. Wie alle Impfstoffe, die intramuskulär verabreicht werden, ist Cervarix mit Vorsicht an Personen mit Thrombozytopenie oder einer anderen Blutgerinnungsstörung zu verabreichen, da es bei diesen Personen nach einer intramuskulären Gabe zu Blutungen kommen kann. **Weitere Informationen siehe Fachinformation.**

Nebenwirkungsmeldungen richten Sie bitte ggf. an die GSK-Hotline: 0800-1223355

Engerix-B Kinder/Erwachsene

Wirkstoff: Hepatitis-B-Impfstoff. **Zusammensetzung:** 1 Fertigspritze Engerix-B Kinder enthält Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBs-Ag), 10 Mikrogramm in 0,5 ml, an hydratisiertes Aluminiumhydroxid adsorbiert. 1 Fertigspritze Engerix-B Erwachsene enthält Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBs-Ag), 20 Mikrogramm in 1,0 ml, an hydratisiertes Aluminiumhydroxid adsorbiert. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Engerix-B wird angewendet, um eine

Hepatitis-B-Infektion zu verhindern. Engerix-B Kinder kann Kindern ab der Geburt bis zum vollendeten 16. Lebensjahr verabreicht werden. Engerix-B Erwachsene kann Erwachsenen und Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr verabreicht werden. U. U. auch Kindern und Jugendlichen im Alter von 11-15 Jahren. **Gegenanzeigen:** Allergie auf Engerix-B oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Impfstoffes. Fieber. **Nebenwirkungen: Sehr häufig:** Schmerzen, Rötung an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Reizbarkeit. **Häufig:** Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Fieber, Unwohlsein, Schwellung an der Injektionsstelle, Reaktionen an der Injektionsstelle wie Verhärtung. **Gelegentlich:** Schwindel, Muskelschmerzen, grippeähnliche Beschwerden. **Selten:** Lymphknotenschwellung, Nesselsucht, Hautausschlag, Juckreiz, Gelenkschmerzen, Missempfindungen. **Sehr selten:** Allergische Reaktionen: Schwellung des Gesichts, niedriger Blutdruck, Atembeschwerden, Blaufärbung der Haut, Bewusstlosigkeit. Neigung zu Blutergüssen und verlängerter Blutungsduer nach Schnittverletzungen, niedriger Blutdruck, Entzündung von Blutgefäßen, Angiodödem, Lähmung, Neuritis, Guillain-Barré-Syndrom, Optikusneuritis, Multiple Sklerose, Neuropathie, Enzephalitis, Enzephalopathie, Meningitis, Krampfanfälle, Hypästhesie, Lichen ruber planus, Erythema exsudativum multiforme, Arthritis, Muskelschwäche.

Verschreibungspflichtig. Stand: September 2015. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. www.glaxosmithkline.de

Weitere Informationen über das Arzneimittel: Dosierung und Art der Anwendung: Engerix-B Kinder: 3 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. Engerix-B Erwachsene: **Schema I:** 3 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema II:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema III:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema IV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema V:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema VI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema VII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema VIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema IX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema X:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XL:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema XLIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema L:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LVIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXV:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVI:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXVIII:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXIX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXX:** 2 Impflungen i.m., Monat 0, 1, 6. **Schema LXXXXXXXXI:** 2 Impflungen i.m., Monat