

## Assessment zur Darstellung eingeschränkter Alltagskompetenz

Name: \_\_\_\_\_ Untersuchungsdatum: \_\_\_\_\_

Diagnose(n): \_\_\_\_\_

Rubrik	Beispiel	JA	NEIN
<b>1. Unkontrolliertes Verlassen der Wohnung / des Wohnbereiches (Weglauf-tendenz)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aus der Wohnung drängen,</li> <li>- planlos in der Wohnung umherlaufen und diese so ungewollt verlassen</li> </ul>		
<b>2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unkontrolliertes Laufen auf die Strasse</li> <li>- die Wohnung in unangemessener Kleidung verlassen und sich so gefährden (z.B. Kälte)</li> </ul>		
<b>3. Unsachgemäßer Umgang mit (potentiell) gefährlichen Gegenständen oder Substanzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlassen von Herdplatten</li> <li>- Unkontrollierte Medikamenteneinnahme</li> <li>- Unangemessener Umgang mit Feuer</li> <li>- Essen von Zigaretten /verdorbenen Lebensmitteln</li> </ul>		
<b>4. Tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schlagen, beißen, bespucken anderer Personen</li> <li>- Zerstörung von Eigentum</li> <li>- Selbst/Fremdverletzung</li> </ul>		
<b>5. Im situativen Kontext inadäquates Verhalten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- einnässen oder einkoten ohne Inkontinenz</li> <li>- Nesteln, zerplücken, zupfen aus ständigem Bewegungsdrang</li> <li>- Essen oder Kot verschmieren</li> <li>- Fremde Gegenstände sammeln oder entwenden</li> <li>- permanentes Schreien oder Rufen ohne Grund</li> </ul> <p>Hinweis: Hier ist auszuschließen, dass das inadäquate Verhalten in Zusammenhang mit fehlender Krankheitseinsicht oder therapieresistentem Wahnerleben und Halluzinationen steht, da dies unter Item 11 dokumentiert wird.</p>		
<b>6. Unfähigkeit die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mangelndes Hunger- oder Durstgefühl</li> <li>- Mangelnde Nahrungs- / Flüssigkeitsaufnahme ohne Grund</li> <li>- Mangelnde Wahrnehmung von Harn-/Stuhldrang</li> <li>- Unfähigkeit der Schmerzwahrnehmung</li> </ul>		

<b>7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- den ganzen Tag im Bett verbringt</li> <li>- sich nicht aktivieren lassen</li> <li>- die Nahrung verweigern</li> </ul> <p>Hinweis: Die Therapieresistenz einer Depression oder Angststörung muss nervenärztlich/psychiatrisch gesichert sein.</p>		
<b>8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen) die zu erheblichen Problemen der sozialen Alltagsleistung führen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vertraute Personen nicht wieder erkennen</li> <li>- mit Geld nicht umgehen können</li> <li>- sich nicht mehr artikulieren können</li> <li>- Zimmer / Wohnung nicht wiederfinden können</li> </ul>		
<b>9. Störungen des Tag/Nacht-Rhythmus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- starke nächtliche Unruhe oder Aufhebung Tag-Nacht-Rhythmus verbunden mit Zunahme inadäquater Verhaltensweisen</li> </ul>		
<b>10. Unfähigkeit, den Tagesablauf selbstständig zu planen / zu strukturieren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfähigkeit, angemessene Körperpflege, Ernährung oder Mobilität einzuhalten</li> </ul> <p>Hinweis: Hier sind nur Beeinträchtigungen zu berücksichtigen, die nicht bereits unter 7 oder 8 erfasst worden sind.</p>		
<b>11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren im Alltag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paranoides Erleben (Verfolgung, Bedrohung, Vergiftungsideen)</li> <li>- Optische/Akustische Halluzinationen</li> </ul> <p>Hinweis: Hier geht es um Verhaltensstörungen, die nicht unter 5. erfasst sind. Diese können vor allem bei Schizophrenien, Demenzen oder schweren Depressionen vorliegen.</p>		
<b>12. Schwer ausgeprägtes oder unkontrolliert emotionales Verhalten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distanzlosigkeit, Euphorie, Reizbarkeit oder erheblich unangemessenes Misstrauen.</li> <li>- schwere Affektinkontinenz / Impulsdurchbrüche</li> </ul>		
<b>13. Ständige Niedergeschlagenheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ständiges Jammern und Klagen</li> <li>- Ständige latente Suizidalität oder das durchgehende Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens.</li> </ul> <p>Hinweis: Die Therapieresistenz einer Depression muss nervenärztlich/psychiatrisch gesichert sein.</p>		

Untersucher / Unterschrift: \_\_\_\_\_